

**Campagne douleur / évaluation des 26-27.02.2004 par échelles visuelles analogiques (E.V.A.) et Doloplus**

Intensité de la douleur (mm)	Pas de traitement antalgique	Anti-inflammatoires	PALIER 1 OMS (paracétamol)	PALIER 2 OMS opiacés faibles (tramadol)	PALIER 3 OMS opiacés (morphine)	Total	
Pas douleur	7		3			10	
Indéterminé	2					2	
0 - 10 mm						0	0 - 10 mm
11 - 20 mm						0	11 - 20 mm
21 -30 mm	3		1			4	21 -30 mm
31 - 40 mm	2	1		1		4	31 - 40 mm
41 - 50 mm	3	1	1	1	1	7	41 - 50 mm
51 - 60 mm	1				1	2	51 - 60 mm
61 - 70 mm	1		1			2	61 - 70 mm
71 - 80 mm		2				2	71 - 80 mm
81 - 90 mm			1			1	81 - 90 mm
91 - 100 mm						0	91 - 100 mm
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	

N.B.: Les patients sous anti-inflammatoires sont enregistrés dans cette catégorie, quand bien même leur médication a aussi un effet antalgique de type PALIER 1 OMS.

- Conclusions:**
1. Beaucoup de patients se plaignant de douleurs ne reçoivent pas d'antalgiques
  2. Plusieurs patients sous anti-inflammatoires souffrent de fortes douleurs
  3. Pour les patients mesurés par doloplus (2), la mesure a été convertie en millimètres